



Ministère de l'Agriculture, de l'Eau des
Ressources Animales et Halieutiques



Direction Générale des Productions Animales - Burkina Faso



ELEVAGE DES PINTADEAUX

Avec l'appui du





CONTEXTE / JUSTIFICATION

L'élevage des pintades joue un rôle socioéconomique majeur surtout en milieu rural. Il génère des revenus réguliers grâce à la vente des œufs, des pintadeaux et des pintades tout en fournissant une chair très appréciée. Cependant, on constate une forte mortalité des pintadeaux dans les élevages traditionnels surtout pendant la phase de démarrage. Cette mortalité est principalement due à la fraîcheur, au mauvais aménagement des poussinières, à une alimentation inadaptée, à un manque d'hygiène et aux maladies. La réussite du démarrage est donc cruciale pour l'élevage des pintades.

OBJECTIFS

Cette fiche technique vise à réduire la mortalité des pintadeaux afin d'améliorer la productivité des élevages de pintades .

PUBLIC CIBLE

Cette fiche s'adresse aux producteurs, agents de vulgarisation et d'appui conseil, étudiants, chercheurs, ONG, etc.

EN QUOI CONSISTE LA PRATIQUE ?

La pratique consiste à entretenir des pintadeaux d'un (1) à soixante (60) jours d'âge en vue de réduire leurs mortalités et favoriser leur croissance optimale.

ETAPES PRATIQUES / TECHNIQUES

La conduite d'une bande de pintadeaux se déroule selon les étapes suivantes :

1. Préparation de la poussinière

Les pintadeaux doivent être élevés dans une poussinière qui peut être un bâtiment ou une cage. Sa capacité varie en fonction du nombre et de l'âge des sujets (50 sujets au m² jusqu'à 2 semaines d'âge, 35 sujets au m² à 3 et 4 semaines et 25 sujets au m² à la 5^e semaine et 10 sujets au m² à partir de la 6^e semaine jusqu'à quatre (04) mois d'âge). La poussinière doit être maintenue sèche et chaude pendant les périodes humides et/ou froides. Après chaque bande, effectuer un vide sanitaire, puis nettoyer et désinfecter avant de mettre en place la litière à raison de 4 à 5 kg/m². Placer les mangeoires, les abreuvoirs et le matériel de chauffage en quantités suffisantes (du 1^{er} au 21^{ème} jour 50 pintadeaux par mangeoire et abreuvoir).

2. Réception des pintadeaux

Pour les pintadeaux issus de la couvaison artificielle, à l'arrivée, décharger rapidement et si possible dans la semi obscurité. Il faut vérifier la qualité des pintadeaux à travers leur vivacité, leur duvet soyeux et sec, leur pépiement modéré, l'absence de symptômes respiratoires, un ombilic bien cicatrisé, le poids et l'homogénéité.

Il faut tenir compte de la densité des pintadeaux et renseigner le nombre et l'état des pintadeaux sur une fiche ou un cahier.

Prendre le temps d'observer le comportement et la répartition des pintadeaux dans l'aire de vie et procéder à la distribution de l'aliment trois (3) heures après la mise en place.

3. Contrôle des paramètres d'ambiances

La poussinière doit fournir des conditions de températures semblables à une mère éleveuse. Il faut procéder au chauffage afin d'avoir une température convenable, stable et homogène dans la poussinière.

Le préchauffage de la poussinière, 36 à 48 heures avant l'arrivée des pintadeaux, est nécessaire. La température de confort des

pintadeaux est d'environ 35°C

La répartition des pintadeaux dans la poussinière est un indicateur de la bonne ambiance et permet de vérifier le respect de certaines normes d'élevage (température, ventilation, lumière, nombre et répartition des points d'eau et d'aliment).

4. Alimentation

L'aliment démarrage est celui destiné aux pintadeaux (0-2 mois). Il contient des vitamines et un taux de protéines compris entre 20 et 23%. A défaut d'un aliment démarrage, une association de termites/asticots, de semoule de céréale (à volonté) et de verdure peut être donnée quotidiennement et en quantité suffisante. Chaque pintadeau consomme 10 g/jour à la première semaine et augmenter de 5 g/semaine d'aliment jusqu'à l'âge de 6 mois). En moyenne un pintadeau consomme 1,5 kg d'aliment en deux mois.


Servir de l'eau propre à volonté. En général le pintadeau consomme environ deux (2) fois plus d'eau que d'aliment. Les aliments et l'eau doivent être propres et servis dans des mangeoires et abreuvoirs propres.

5. Santé

Les pintadeaux sont sensibles à de nombreuses pathologies infectieuses et parasites comme la maladie de New Castle, la variole aviaire et la trichomonose. A celles-ci s'ajoutent les carences alimentaires.

Le meilleur moyen pour protéger les pintadeaux est la prévention par la vaccination et les déparasitages. En cas de maladies, notamment la maladie de New Castle, pratiquer l'isolement, l'abattage des malades, la destruction et l'enfouissement des cadavres.

Désinfecter tous les locaux et matériel ayant eu contact avec les malades. Aussi, l'hygiène de l'habitat, du personnel et du matériel contribuent à protéger les pintadeaux.



Répartition des pintadeaux en fonction de l'ambiance

Ingrédients (kg)	Pintadeaux de 1 à 60 j (%)
Céréales (maïs, sorgho)	6
Tourteaux (soja ou coton)	2
Farine de poisson	1,2
Son de blé, de Maïs de mil	0,5
Mélange minéral	0,3
Complément	Verdure Termites

Formules alimentaires pintadeaux

EXIGENCES /ERREURS A EVITER

- ▶ les situations stressantes (grand bruit, manipulation brutale) ;
- ▶ l'usage abusif d'antibiotiques ;
- ▶ le changement brutal de ration alimentaire ;
- ▶ les pintadeaux sont très sensibles au froid et aux variations de température ;
- ▶ l'ejointage (tailler les ailes) ;
- ▶ le mélange de volailles d'espèces et d'âges différents ;
- ▶ l'utilisation de l'aliment poulet à la place de l'aliment pintadeaux
- ▶ la distribution irrégulière ou rupture de la ration
- ▶ la vaccination négligée ou mal planifiée

MESSAGES CLES

- ▶ Le froid et le parasitisme sont les principales causes de la mortalité des pintadeaux.
- ▶ Un bon chauffage, une bonne hygiène et une alimentation adéquate permettent de garantir la réussite de l'élevage des pintadeaux.
- ▶ L'usage abusif d'antimicrobiens est à proscrire.
- ▶ Le changement brutal de ration alimentaire est préjudiciable pour les pintadeaux.
- ▶ Les situations stressantes (grand bruit, manipulation brutale) sont à éviter

REFERENCES/SOURCES

- CPAVI/MARAH, 2021. Fiches techniques simplifiées RTE pintade. 27p.
- MARAH, 2020. Référentiel Technico Economiques (RTE) de conduite d'un élevage de pintades locales. 63p.
- PDES, 1998. Manuel du vulgarisateur en élevage au sahel. 109p.

